



División de Medicina Nuclear

INSTRUCCIONES PARA PACIENTES QUE SE SOMETERÁN A UNA TOMOGRAFÍA DE DIAGNÓSTICO POR INMUNOTRANSFERENCIA CON YODO RADIACTIVO: 2 a 4 mCi I-131

1. No consuma comidas abundantes durante 2 horas después de tragar el yodo radiactivo, puede beber líquidos en cualquier momento.
2. Beba mucho líquido (de cualquier tipo) durante al menos los 2 primeros días.
3. Mastique goma de mascar, chupe un caramelo ácido y consuma refrigerios pequeños de manera frecuente para mantener el flujo de saliva durante 2 a 7 días.
4. Vacíe su vejiga con frecuencia.
5. Tire de la cadena del inodoro 2 veces después de cada vez que lo use durante 48 horas.
6. Manténgase a una distancia prudente de otros adultos y niños durante al menos los 2 primeros días.
7. Debido a que los niños son más sensibles a la radiación, limite el contacto directo al estrictamente necesario para proporcionarle cuidados durante al menos 2 días.
8. Duerma solo en la cama durante al menos 1 noche.
9. No viaje en avión o en transporte público durante al menos los 2 primeros días.
10. No haga un viaje prolongado en automóvil con otras personas durante al menos los 2 primeros días.
11. Tome un laxante en caso de que no haya tenido deposiciones durante 2 días después de su terapia con yodo radiactivo.

DO NOT SIGN, SIGN ENGLISH VERSION ONLY - NO FIRMAR FIRME SÓLO LA VERSIÓN EN INGLÉS

Firma del paciente

Fecha

DO NOT SIGN, SIGN ENGLISH VERSION ONLY - NO FIRMAR FIRME SÓLO LA VERSIÓN EN INGLÉS

Firma del médico

Fecha