



INSERCIÓN DE UNA LÍNEA CENTRAL

INSERTION OF A CENTRAL LINE

Estas instrucciones le serán de ayuda para cuidarse a sí mismo(a) en su hogar.



DIETA

Empiece con líquidos claros luego de llegar a su hogar. Si después de 45 minutos no se siente enfermo(a), pruebe primero con alimentos blandos y posteriormente reanude su dieta normal.




ACTIVIDADES

Descanse el día de hoy. Durante unos días no levante objetos pesados y no haga esfuerzos; después puede reanudar gradualmente su actividad normal.



CUIDADO ESPECIAL NECESARIO

Si tiene falta de respiración, dolor de pecho repentino, tose con sangre, tiene inflamación o pérdida de sangre en el lugar de la cirugía, llame a su doctor o vaya a la sala de emergencia más cercana. Mantenga su vendaje limpio y seco por 48 horas, después remuévalo y puede darse una ducha. Si tiene tiras antisépticas sobre la piel, déjeselas por otros 5-7 días.



INFECCIÓN

Observe cualquier señal de infección después de la cirugía: **fiebre, escalofríos, aumento del dolor, enrojecimiento, inflamación o secreción maloliente proveniente de su herida.** Llame a su doctor a la primera señal de cualquier infección.



CUANDO LLAMAR A SU DOCTOR

Llame al 434-924-0000 y pida lo comuniquen con el "Residente de Guardia" el Dr. _____ sí:

- No ha orinado en ocho (8) horas después de la cirugía
- No ha defecado en tres (3) días
- Hay señales de infección como se indica anteriormente
- Tiene vómito por más de cuatro (4) horas
- Tiene gran cantidad de pérdida de sangre o inflamación

Si usted tiene dolor en el pecho o dificultad para respirar, llame al 911