



REMOCIÓN DE UNA LÍNEA CENTRAL

REMOVAL OF A CENTRAL LINE

Estas instrucciones le serán de ayuda para cuidarse a sí mismo(a) en su hogar.



DIETA

Empiece con líquidos claros luego de llegar a su hogar. Si después de 45 minutos no se siente enfermo(a), pruebe primero con alimentos blandos y posteriormente reanude su dieta normal.




ACTIVIDADES

Descanse el día de hoy. Durante unos días no levante objetos pesados ni se esfuerce, después puede reanudar su actividad normal gradualmente.



CUIDADO ESPECIAL NECESARIO

Si tiene falta de respiración, dolor de pecho repentino, tose con sangre, tiene inflamación o pérdida de sangre en el lugar de la cirugía, llame a su doctor o vaya a la sala de emergencia más cercana. Mantenga su vendaje limpio y seco por 48 horas, después remuévalo y puede darse una ducha. Si tiene tiras antisépticas sobre la piel, déjeselas por otros 5-7 días.



INFECCIÓN

Observe cualquier señal de infección después de la cirugía: **fiebre, escalofríos, aumento del dolor, enrojecimiento, inflamación o secreción maloliente proveniente de su herida.** Llame a su doctor a la primera señal de cualquier infección.



CUANDO LLAMAR A SU DOCTOR

Llame al 434-924-0000 y pida lo comuniquen con el "Residente de Guardia" el Dr. _____ sí:

- No ha orinado en ocho (8) horas después de la cirugía
- No ha defecado en tres (3) días
- Hay señales de infección como se indica anteriormente
- Tiene vómito por más de cuatro (4) horas
- Tiene gran pérdida de sangre o inflamación

Si usted tiene dolor en el pecho o dificultad para respirar, llame al 911