

# CIRCUNCISIÓN

## CIRCUMCISION

Estas instrucciones le serán de ayuda para cuidarse a sí mismo en su hogar



### DIETA

Empiece con líquidos claros luego de llegar a casa. Si después de 45 minutos no se enferma, pruebe primero con alimentos blandos y posteriormente reanude su dieta normal.




### ACTIVIDADES

Reanude sus actividades normales como lo vaya tolerando.



### CUIDADO ESPECIAL NECESARIO

Quite los pañales sucios inmediatamente o cambie el pañal cada 4 horas. Limpie el área con un paño suave, templado, humedecido. No utilice toallas húmedas desechables, lociones o talcos. Aplique una pequeña cantidad de Vaseline o un ungüento antibiótico a la punta del pene cada vez que cambie el pañal. Si su niño tiene puntadas, éstas se disolverán solas. Es probable que note una pequeña cantidad de pérdida de sangre en las siguientes 48 horas.



### INFECCIÓN

Observe cualquier señal de infección después de la cirugía: **fiebre, escalofríos, aumento de dolor, enrojecimiento, inflamación o secreción maloliente proveniente de su herida.** Llame a su doctor a la primera señal de cualquier infección.



### CUANDO LLAMAR A SU DOCTOR

Llame al 434-924-0000 y pida lo comuniquen con el "Residente de guardia" del Dr. \_\_\_\_\_ si:

- No hay orina después de ocho (8) horas después de la cirugía
- No ha defecado en tres (3) días
- Hay señales de infección como se indica anteriormente
- Tiene vómito por más de cuatro (4) horas
- Gran cantidad de pérdida de sangre o inflamación

**En caso de una emergencia, llame al 911**