



# CIRUGÍA OCULAR

## EYE SURGERY

Estas instrucciones le serán de ayuda para cuidarse a sí mismo(a) en su hogar.



### DIETA

Empezar con líquidos claros una vez que haya llegado a su hogar. Si después de 45 minutos no se siente enfermo(a), pruebe alimentos blandos y posteriormente reanude su dieta normal.



### ACTIVIDADES

Reanude sus actividades normales tales como el caminar y trabajo ligero en el hogar.




### CUIDADO ESPECIAL NECESARIO

Al menos que se le indique lo contrario mantenga el parche y el protector ocular en su lugar. No ponga ningún medicamento en su ojo hasta que el doctor le examine al día siguiente.



### MEDICAMENTOS

Reanude los medicamentos previamente prescritos, incluyendo aquéllos para la diabetes.



### QUÉ SE PUEDE ESPERAR DESPUÉS DE LA CIRUGÍA OCULAR.

- Sensibilidad dolorosa o malestar fácilmente controlado con Tylenol
- Leve secreción con sangre en el vendaje del ojo
- Leve inflamación en el párpado del ojo operado
- Irritación en el ojo operado

Estas condiciones deben de disminuir cada día



### CUANDO LLAMAR A SU DOCTOR

Comuníquese al 434-924-0000 y pregunte por el "Residente en Turno" del Dr. \_\_\_\_\_ si:

- El dolor aumenta y no se alivia con Tylenol
- Aumenta la secreción con sangre en el vendaje del ojo
- Aumenta la inflamación de los párpados
- La náusea o el vómito van en aumento
- Se presenta una repentina pérdida de la vista
- Se presenta cualquier otro problema inesperado

**Si usted tiene dolor en el pecho o dificultad para respirar, llame al 911**