



SEÑALES DE INFECCIÓN Y SÍNTOMAS

INFECTION SIGNS AND SYMPTOMS

Estas instrucciones le serán de ayuda para cuidarse a sí mismo(a) en su hogar.



DIETA

Después de llegar a su hogar, empiece con líquidos claros. Si no se siente enferma después de 45 minutos puede probar con alimentos blandos primero para después reanudar su dieta normal.



CUIDADO ESPECIAL NECESARIO

Observe el sitio de su cirugía por cualquier señal de infección como:

- Enrojecimiento en el sitio
- Inflamación alrededor del sitio
- Sensibilidad intensa o dolor
- Pérdida de sangre o secreción anormal o maloliente
- Fiebre o temperatura más alta de 101° F o 38.5° C.



MEDICAMENTOS

Si usted está tomando cualquier medicamento que contenga ASPIRINA o TYLENOL (acetaminophen), entonces cheque su temperatura 4 horas DESPUES de haber tomado la medicina.



CUANDO LLAMAR A SU DOCTOR

Llame al 434-924-0000 y pida lo comuniquen con el "Residente de Guardia" del Dr. _____ si:

- Tiene cualquier señal de infección
- No ha orinado en ocho (8) horas después de la cirugía
- No ha defecado en tres (3) días
- Tiene vómito por más de cuatro (4) horas
- Hay gran pérdida de sangre o inflamación

Si usted tiene dolor en el pecho o dificultad para respirar, llame al 911