



QUITANDO EL STRUT PEDIÁTRICO

PEDIATRIC STRUT REMOVAL

Estas instrucciones le ayudarán a tener cuidado en su hogar.



DIETA

Empiece con líquidos luego de llegar a su hogar. Si después de 45 minutos no se siente enfermo(a), pruebe primero con alimentos blandos y posteriormente reanude su dieta normal.



ACTIVIDADES

Descanso el día de hoy. Gradualmente reanude la actividad normal.




CUIDADO ESPECIAL NECESARIO

Mantenga la incisión limpia y seca durante 5 días. Permita que las cintas adhesivas se desprendan por sí solas.



MEDICAMENTOS

Tome la medicina que le han recetado de acuerdo a las indicaciones.



INFECCIÓN

Observe cualquier señal de infección después de la cirugía: **fiebre, escalofríos, aumento del dolor, enrojecimiento, inflamación o secreción maloliente proveniente de su herida.** Llame a su doctor a la primera señal de cualquier infección.



CUANDO LLAMAR A SU DOCTOR

Llame al 434-924-0000 y pida lo comuniquen con el "Residente de guardia" del Dr. _____ sí:

- No ha orinado en ocho (8) horas después de la cirugía
- No ha defecado en tres (3) días
- Hay señales de infección como se indica anteriormente
- Tiene vómito por más de cuatro (4) horas
- Tiene gran cantidad de pérdida de sangre o inflamación

En caso de una emergencia, llame al 911