



# CIRUGIA CON ESCISIÓN LOCAL AMPLIA

## WIDE LOCAL EXCISION SURGERY

Estas instrucciones le serán de ayuda para cuidarse a sí misma(o) en su hogar.



### DIETA

Empiece con líquidos claros luego de llegar a su hogar. Si después de 45 minutos no se siente enferma, pruebe primero con alimentos blandos y posteriormente reanude su dieta normal.




### ACTIVIDADES

Descanse el día de hoy. Evite cualquier esfuerzo prolongado, especialmente cualquier acción que cause tensión o que estire la herida.



### CUIDADO ESPECIAL NECESARIO

Mantenga su vendaje en su lugar por 48 horas (2) días. Consérvelo limpio y seco, después puede quitárselo y ducharse. Por debajo de su vendaje se encuentran tiras estériles adhesivas sobre la piel las cuales debe dejar hasta que se desprendan solas.



### INFECCIÓN

Observe cualquier señal de infección después de la cirugía: **fiebre, escalofríos, aumento del dolor, enrojecimiento, inflamación o secreción maloliente procedente de su herida.** Llame a su doctor a la primera señal de cualquier infección.



### CUANDO LLAMAR A SU DOCTOR

Llame al 434-924-0000 y pida la comuniquen con el "Residente de guardia" del Dr. \_\_\_\_\_ si:

- No ha orinado ocho (8) horas después de la cirugía
- No ha defecado en tres (3) días
- Hay señales de infección como se indica con anterioridad
- Tiene vómito por más de cuatro (4) horas
- Tiene gran cantidad de pérdida de sangre o inflamación

**Si usted tiene dolor en el pecho o dificultad para respirar, llame al 911**