



CIRUGÍA PEDIÁTRICA DE HERNIA

PEDIATRIC HERNIA REPAIR

Estas instrucciones le serán de ayuda para el cuidado en el hogar.



DIETA

Ofrezca líquidos claros cuando despierte y esté alerta. Si se presenta un vómito, espere una (1) hora y ofrezca líquidos claros nuevamente. Puede reanudar su dieta normal si no vomita.



ACTIVIDADES

Descanso el día de hoy. Los bebés y niños pequeños puedan reanudar sus actividades normales después de que hayan desaparecido los efectos de la anestesia. Los niños de más edad deben de participar en actividades moderadas durante los primeros días después de la cirugía y durante seis semanas después de la cirugía abstenerse de levantar objetos pesados (mayores de 15 libras) o hasta que el doctor lo permita.



CUIDADO ESPECIAL NECESARIO

Vendaje: Puede retirar el o los vendajes de la incisión o incisiones en _____ horas. Deje las tiras estériles en su lugar.

Cuidado de la Incisión: Mantenga las tiras estériles y la incisión o incisiones limpias y secas durante _____ días.


Puede bañarse en bañera _____.

Con respecto a niños pequeños cheque el pañal con frecuencia y cámbielo cuando sea necesario.



MEDICAMENTOS

Dar Tylenol si hay molestia al menos que se le haya recetado otro medicamento.



INFECCIÓN

Observe cualquier señal de infección después de la cirugía: **fiebre, escalofríos, aumento del dolor, enrojecimiento, inflamación o secreción maloliente proveniente de su herida.** Llame a su doctor a la primera señal de cualquier infección.



CUANDO LLAMAR A SU DOCTOR

Llame al 434-924-0000 y pida lo comuniquen con el "Residente de guardia" del Dr. _____ si:

- Tiene fiebre de 101°F sin otros síntomas (como dolor de oído). Si otros síntomas están presentes junto con la fiebre, comuníquese con su Pediatra.
- Tiene fuerte dolor. Es normal algo de sensibilidad dentro y alrededor de la incisión.
- No puede orinar 10 horas después de la cirugía.
- No ha defecado en tres (3) días
- Hay señales de infección como se indica anteriormente
- Tiene vómito por más de cuatro (4) horas
- Tiene gran cantidad de pérdida de sangre o inflamación.

En caso de una emergencia, llame al 911