



INSTRUCCIONES DE ALTA PARA ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA (LIVER RFA DISCHARGE INSTRUCTIONS)

- Decanse y tómelolo con calma durante las próximas 24 horas.
- **No maneje su coche** o maquinaria pesada en 24 horas.
- Durante las proximas 24 horas no levante objetos que pesen mas de 5 libras.
- Durante siete dias por lo menos no practique ejercicios agotadores o levante pesas.
- Reanude su dieta casera.
- Beba muchos líquidos.
- **No consuma bebidas alcoholicas** mientras este tomando medicamentos para el dolor o Tylenol.
- Durante las proximas 48 horas mantenga una tira adhesive (band-aid) sobre el sitio de la incisión para protegerlo.
- No bañarse en la bañera ni nadir durante 7 dias (no sumergirse dentro del agua durante 7 dias).
- Pongase en contacto con Angiologia si empieza a tener:
 - Dolor o empeora el malestar de torax
 - Falta de respiracion (le cuesta trabajo respirar)
 - Orina obscura\
 - Malteria fecal del color de la arena
 - Inflamación de estómago o piernas
 - Fiebre de 100°F. por mas de 48 horas o mas alta de 101°F.
- Si el sitio esta sangrante pongase encontacto con nosotros inmediatamente al 434-924-9401; o al 434-924-9400 despues de las 5 PM.
- Si se utilize un cateter urinario durante su estancia en el hospital y siente irritación al orinar, tiene dolor o fiebre, llame a su doctor.
- Si tiene cualquier pregunta o problema, por favor comuniquese con el Departamento de Angiología/Radiología de Intervención y hable con la enfermera médica o con doctores. Durante el día (7 AM – 5 PM) de Lunes a Viernes: 434-924-9401; a otras horas, fin de semana o días festivos, 434-924-9400 y pida lo comuniquen con el responsable de turno de Angiología/Radiología de Intervención.