



REEMPLAZO DE LA BATERÍA PARA EL DISPOSITIVO DE ESTIMULACIÓN CEREBRAL PROFUNDA (DBS POR SU NOMBRE EN INGLÉS)

DBS (DEEP BRAIN STIMULATOR) BATTERY REPLACEMENT

Estas instrucciones le serán de ayuda para cuidarse usted mismo en su hogar.



DIETA

Una vez de regreso en su hogar, empiece con líquidos claros. Espere alrededor de 45 minutos y si no se siente enfermo, pruebe alimentarse a base de una dieta blanda para después proseguir con su dieta habitual.



ACTIVIDAD


Reanude las actividades que acostumbra. No lleve a cabo actividades fuertes o levante objetos pesados. Si le causa dolor no lo haga. Puede conducir en pocos días.

ATENCIÓN ESPECIAL E INSTRUCCIONES

Sus suturas se disuelven solas y no necesita retirarlas. La línea de la incisión está recubierta con un pegamento de la piel llamado Dermabond. Este se desprenderá por sí solo en aproximadamente 5-7 días. Puede ducharse después de 24 horas y secar la incisión con suavidad. No debe de nadar o sumergir en agua el área de la incisión durante 3 semanas o hasta que la incisión haya sanado.

CONTROL DEL DOLOR: Puede llegar a sentir dolor en la incisión o dolor debido a la tunelización del cable de extensión. Obtendrá mejores resultados para controlar el dolor tomando Ibuprofen de 400-600 mg cada 8 horas. De ser necesario, le proporcionaremos un narcótico leve para que lo tome durante unos días.

SEGUIMIENTO: Si el dispositivo no es inmediatamente reactivado, le darán una cita para que se lo programen. **NO** tome sus medicamentos el día de su consulta para que podamos programar su estimulador eficazmente.



INFECCIÓN

Después de la cirugía, observe su incisión diariamente y esté pendiente de cualquier señal de infección. Comuníquese inmediatamente si muestra señales de fiebre, escalofríos, aumento de dolor, enrojecimiento o hinchazón.



CUANDO DEBE DE LLAMAR A SU MÉDICO

Llame al 434-924-0000 y pida lo comuniquen con el "Residente de guardia", el Dr. _____ si se presenta lo siguiente:

- No ha orinado después de que hayan pasado (8) horas de la cirugía
- No ha defecado en (3) días
- Hay signos de infección como los anteriores
- Tiene vómito persistente por más de cuatro (4) horas
- Gran cantidad de pérdida de sangre (más de una cucharadita)

Si usted tiene dolor en el pecho o dificultad para respirar, llame al 911