



INYECCIÓN DE GLICEROL O RIZOTOMÍA

GLYCEROL INJECTION OR RHIZOTOMY

Estas instrucciones le ayudarán para cuidarse usted mismo en su hogar.



DIETA

Una vez de regreso a su hogar, empiece con líquidos claros. Espere como 45 minutos y si no se siente enfermo, pruebe alimentarse a base de una dieta blanda para después proseguir con dieta habitual.



ACTIVIDAD

Puede reanudar sus actividades normales como lo hacía antes de la cirugía.




ATENCIÓN ESPECIAL E INSTRUCCIONES

Puede sentir dolor y tener amoratado el lugar donde se inyecta. No hay suturas ni es necesario cuidar la incisión. Puede ducharse al día siguiente. Es muy común sentir dolor en el lado que fue inyectado al frente de la mandíbula o el oído. Esto por lo general disminuye en una semana. Es de esperarse un entumecimiento en ese lado de la cara lo cual puede también sentirse en el interior de la boca, mejilla y lengua. La pérdida de sensación puede ser densa al principio y sentirá como si su cara estuviera hinchada; gradualmente se mitigará pero permanecerá un tanto adormecida. Inicialmente tendrá dificultad en masticar sus alimentos y también puede sentir resequedad en los ojos.

Medicamentos

Continúe con todos los medicamentos que estaba tomando para el dolor antes del procedimiento, aunque se haya resuelto el dolor del trigémino. Tendremos que discutir cómo vamos a ir reduciendo estos medicamentos más tarde y colaboraremos con su médico para poder alcanzar este objetivo. Se le dará medicamento para que se lo lleve, pero probablemente solo necesitará Ibuprofen u otro medicamento anti-inflamatorio no esteroide para aliviar su dolor en la mejilla.



INFECCIÓN

Esté pendiente de cualquier señal de infección después de su cirugía. Comuníquese inmediatamente si tiene drenaje, fiebre, escalofríos, aumento del dolor, enrojecimiento o hinchazón. Por favor llame a su médico si tiene fiebre, preguntas o preocupaciones.



CUANDO DEBE DE LLAMAR A SU MÉDICO

Llame al 434-924-0000 y pida lo comuniquen con el "Residente de guardia", el Dr. _____ si se presenta lo siguiente:

- No ha orinado después de que hayan pasado (8) horas de la cirugía
- No ha defecado en (3) días
- Hay signos de infección como los anteriores
- Tiene vómito persistente por más de cuatro (4) horas
- Gran cantidad de pérdida de sangre (más de una cucharadita)

Si usted tiene dolor en el pecho o dificultad para respirar, llame al 911