



IMPLANTE DE ESTIMULADOR DEL NERVI O VAGO

VAGAL NERVE STIMULATOR IMPLANT

Estas instrucciones ayudarán a cuidarse usted mismo en su hogar.



DIETA

Una vez que haya regresado a su hogar, empiece con líquidos claros. Espere como 45 minutos y si no se siente enfermo, pruebe alimentarse a base de una dieta blanda para después proseguir con su dieta habitual.



ACTIVIDAD

Descanse el día de hoy y reanude lentamente sus actividades habituales al día siguiente según lo vaya tolerando.



CUIDADO ESPECIAL E INSTRUCCIONES


Cuidado de la incisión Tendrá suturas internas que se disuelven solas y la línea de la incisión estará recubierta con un pegamento de la piel llamado Dermabond. Este se desprenderá por sí solo alrededor de 5-7 días. Puede ducharse después de 24 horas y secar la incisión con suavidad. NO se sumerja en la bañera o la alberca durante 2 semanas. NO aplique pomadas, cremas, alcohol o agua oxigenada en su incisión.

Control del dolor Puede tomar Ibuprofen o Tylenol para disminuir el dolor si lo necesita. Para un dolor más fuerte, se le dará una receta para un medicamento narcótico. El dolor debe calmarse en 2-3 días.

Efectos secundarios Puede tener algunos efectos secundarios que incluyen el cambio de voz (ronquera cuando pulsa), bradicardia, apnea del sueño, aumento de tos, dificultad al tragar, sensación de picor en la piel en esa área o dolor de garganta.

Precauciones NO debe someterse a Imágenes de Resonancia Magnética (MRI en inglés) a Diatermias o procedimientos de Ablación por Radiofrecuencia. Debe de evitar los fuertes campos magnéticos o eléctricos.

Atención médica de seguimiento Manténgase en contacto con su neurólogo o psicólogo como está previsto para programar su estimulador.



INFECCIÓN

Esté pendiente de cualquier señal de infección después de la cirugía como la **fiebre, escalofríos, drenaje, aumento del dolor, enrojecimiento o hinchazón.**



CUANDO DEBE DE LLAMAR A SU MÉDICO

Llame al 434-924-0000 y pida lo comuniquen con el "Residente de guardia", el Dr. _____ si se presenta lo siguiente:

- No ha orinado después de que hayan pasado (8) horas de la cirugía
- No ha defecado en (3) días
- Hay signos de infección como los anteriores
- Tiene vómito persistente por más de cuatro (4) horas
- Gran cantidad de pérdida de sangre (más de una cucharadita)

Si usted tiene dolor en el pecho o dificultad para respirar, llame al 911